

浙皖刚竹属一新种*

李书春 吴诗华 陈绍云

(安徽农学院)

(杭州植物园)

A NEW SPECIES OF PHYLLOSTACHYS FROM
ZHEJIANG AND ANHUI

LI SHU-CHUN WU SHI-HWA

(Anhui Agricultural College)

CHEN SHAO-YUN

(Hangzhou Botanic Garden)

毛壳竹 新种 图 1

Phyllostachys hispida S. C. Li, S. H. Wu et S. Y. Chen, sp. nov.

Culmi erecti, usque 3.5 m alti, 1.1—2 cm in diam., primo purpurello-virides, sparse farinosi, strigosi, annulo dense albo-farinoso infra nodos instructi. Vaginae culmi tenues, papyraceae, viridi-purpureae, hispidae, farinosae, apice striis lacteis vel lilacinis, radiantibus notatae, inferne maculis sparsis minutis brunneis oblectae, laminis erectis, anguste triangulatis usque lanceolatis, viridi-purpureis, auriculis purpureis, falcatae vel pusillae, setis oralibus nonnullis, ligulis truncate vel leviter arcuatis atropurpureis, apice irregularibus, margine ciliis purpureis usque niveis instructis. Folia in quoque ramulo 2, laminis 5—11 cm longis, 0.9—1.1 cm latis, nervis secundariis 5—6-jugis; auriculis pusillis, setis oralibus deciduis. Inflorescentia incognita. Turiones Aprilis germinantes.

Species affinis *P. bissetii* McCl., sed vaginis culmi hispida, apice striis lacteis vel lilacinis notatis, ligulis truncate vel leviter arcuatis, atropurpureis, apice irregularibus, margine ciliis purpureis usque niveis instructis differt.

Zhejiang: Hangzhou Bot. Gard., Wang Cheng-ping and Ye Guang-han 8041 (Type, NJU); same locality, Chen Shao-yun and Yao Chang-yu 75020.

Anhui: Shucheng, Kuang-gi, Li Shu-Chun and Wu Shi-hwa 621.

秆直立,高3—3.5米,直径1.1—2厘米,秆壁厚0.3毫米,表面有不规则细纵沟。全秆25节,第2节间长8.5厘米,第6节间19厘米,最长节间20厘米(第8节),圆形,分枝以上节间半圆形,幼秆绿色带紫,微被白粉,有毛,粗糙,箨环下白粉圈明显。老秆绿色或灰绿色。秆环隆起,高于箨环,节内长3毫米。箨鞘薄纸质,暗绿紫色,先端有乳白色或淡紫色放射状纵条纹,被灰白色密集小刚毛和白粉,边缘有纤毛,秆下部箨鞘先端有稀疏棕色小点;箨耳紫色,通常着生在秆上部的箨鞘上,形状变化幅度大,镰刀形或微弱发育,或仅一侧发育,耳缘与鞘口着生数枚弯曲繸毛;箨舌截平或微呈弧形,暗紫色,先端不整齐,边

* 在标本鉴定过程中,承南京大学生物系王正平、叶光汉二位老师指导,特此致谢。

缘有流苏状之紫色至白色纤毛；箨叶直立，狭三角形至披针形，基部较宽，略窄于箨鞘顶宽，绿紫色。第2—6节开始分枝，通常2枚，叶片长5—11厘米，宽0.9—1.1厘米，上面深绿色，下面粉绿色（一侧微带黄绿色）；叶舌黄绿色，叶缘一侧有锯齿，侧脉5—6对；叶耳微弱发育，有数枚脱落性缝毛，叶下面基部微被毛。花未见。笋期4月中旬，暗绿紫色。

本种与蓉城竹 *P. bissetii* McCl. 相似，其区别在于前者箨鞘先端有乳白色或淡紫色放射状纵条纹，被有灰白色密集小刚毛，箨舌截平或微呈弧形，暗紫色，先端不整齐，边缘有流苏状之紫色至白色纤毛。

浙江：杭州植物园，当地称“大毛毛竹”，王正平、叶光汉 8041 号，采于杭州植物园（模式，存南京大学生物系标本室）；同地，陈绍云、姚昌豫 75020 号。

安徽：舒城孔集公社，当地称“乌背竹”，李书春、吴诗华 621 号。




图1 毛亮竹 *Phyllostachys hispida* S. H. Wu et S. Y. Chen,

1.笋；2.枝叶；3.秆箨背面；4.秆箨腹面。